

วัคซีนฉีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

Thailändska

ในขณะที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช๑เอ็น๑) แล้ว จากข้อมูลต่อไปนี้ ท่านสามารถที่จะศึกษาได้ว่าจะจะเป็นเช่นไรต่อไปและจะสามารถค้นหาใครได้เมื่อมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช๑เอ็น๑) A(H1N1)

โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช๑เอ็น๑) เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ยังไม่มีใครเคยป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อนจึงเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครที่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้ จึงมีผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยโรคนี้น่าจะมากกว่าไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล

อาการป่วยจะมีเช่น เป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ พร้อมด้วยปวดศีรษะและปวดตามกล้ามเนื้อ คุณจะเหนื่อยบ่อยและอาจจะอาเจียนและท้องเสียอาการป่วยต่างๆ จะหายไปภายในประมาณสัปดาห์ บางคนอาจมีคนที่ตั้งครรรภ์และผู้ที่เป็นมีโรคหัวใจและปอดเรื้อรังจะมีความเสี่ยงในการที่จะป่วยมากขึ้นและอาจเกิดมีภาวะโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นโรคปอดบวมได้

เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อได้รับการฉีดวัคซีน?

เมื่อได้รับการฉีดวัคซีน จะนำส่วนของเชื้อไวรัสที่ไม่ทำงานเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างการป้องกันต่อเชื้อไวรัส แต่จะไม่เพียงพอในการป้องกันไม่ให้ป่วย แต่จะพอเพียงสำหรับการสร้างการป้องกันต่อโรคได้ (ภูมิคุ้มกัน) ถ้าต่อไปในภายหลังท่านเกิดมีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำการกระตุ้นล่วงหน้าอย่างเฉียบไวเพื่อปะทะกับเชื้อไวรัสและทำให้เชื้อโรคไม่มีอันตราย โดยที่โรคยังไม่ปรากฏ

วัคซีนให้การป้องกันต่อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (เอช๑เอ็น๑) ได้อย่างไร?

วัคซีน Pandemrix ซึ่งใช้ฉีดต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช๑เอ็น๑) นั้น จะให้ผลการป้องกันต่อการติดเชื้อหวัดได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นจะได้รับการป้องกันได้

เต็มที่ แต่ถ้ามีคนจำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงให้คนกลุ่มน้อยที่ไม่สามารถรับการป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ได้เผชิญกับโรคไข้หวัดดังกล่าว

จะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นใหม่?

เฉียบเช่นกับยารักษาทั้งหลาย วัคซีน Pandemrix สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ แต่จะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้รับวัคซีน ผลข้างเคียงถ้าเกิดปกติก็จะหายภายใน 1-2 วันโดยไม่ต้องมีการรักษา แต่ถ้าไม่หาย หรือมีอาการของผลข้างเคียงซึ่งไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ก็ขอให้ติดต่อกับสถานพยาบาลด้วย

- อาการปกติมาก (ซึ่งค้นพบอย่างน้อยใน 1 จาก 10 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีน): เจ็บปวด แดง บวม หรือ มีตุ่มนูนเฉพาะที่บริเวณฉีด ยา ปวดศีรษะ เหนื่อยรำ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ
- อาการปกติ (ซึ่งค้นพบอย่างน้อยใน 1 จาก 100 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีน): รู้สึกอ่อน คัน บวมชั่วคราวที่ฉีดยา เหนือไหล่มาก
- อาการไม่ค่อยปกติ (ซึ่งค้นพบอย่างน้อยใน 1 จาก 1,000 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีน): เจ็บจัดๆ หรือรู้สึกชาที่มือหรือเท้า ง่วงนอน เวียนศีรษะ ท้องร่วง อาเจียน ปวดท้อง รู้สึกไม่สบาย คัน เป็นผื่น รู้สึกป่วยโดยทั่วๆ ไป นอนไม่หลับ

คุณอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมไหม?

คุณควรที่จะพูดคุยกับหน่วยงาน ณ ที่คุณได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปที่ 1177 ศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการด้านการแพทย์หรือไม่ก็ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการด้านการแพทย์ของมณฑลที่คุณพักอาศัยอยู่ สามารถติดต่อกับศูนย์ฯ 1177 นั้นได้ทางเบอร์โทร. 1177 หรือ ที่เว็บไซต์ www.1177.se.

